

AZUFRE MICRONIZADO P300/100

98,5 % AZUFRE (S)
FUNGICIDA - ACARICIDA



DP

PRODUCTO
NO ADR



DESCRIPCIÓN: Azufre micronizado de tamaño de partícula seleccionado por aspiración selectiva, indicado como tratamiento fungicida y acaricida en espolvoreo.

VENTAJAS

- ✓ El azufre es un excelente antioídido, con efecto frenante de ácaros y eriódidos.
- ✓ El tamaño de las partículas del micronizado de AFEPASA tienen un rango muy amplio de 40 a 70 μ , que favorece a mejorar la cobertura de la aplicación.
- ✓ Gran fluidez y estabilidad del producto.
- ✓ Gracias a su menor partícula, combina un efecto de choque con un efecto más residual.
- ✓ Al bloquear diferentes procesos fisiológicos del hongo, actúa como un multisite y no genera resistencias.
- ✓ Menos aglomeración y compactación, que se visualiza con una aplicación más homogénea sobre el fruto y la planta, obteniendo mejor dosificación y evitando además la formación de agregados.
- ✓ Se almacena mejor porque no se apelmaza.





COMPOSICIÓN

• **Azufre (S)** **98,5 %**



MODO DE EMPLEO

1. Utilizar aplicado en espolvoreo, tomando las precauciones adecuadas para prevenir riesgos a las personas y al medioambiente.
2. Evitar el tratamiento con aceites 21 días antes y 21 días después de la aplicación del producto.
3. No aplicar foliarmente con temperaturas superiores a 30° C.

¿POR QUÉ ME CONVIENE USARLO?

- El AZUFRE MICRONIZADO P300/100 confiere una protección total a la planta, previniendo enfermedades como el oídio y generando un ambiente hostil para los ácaros.
- La gran fluidez del producto hace que llegue a todas las partes de la planta.
- Te permite trabajar mejor con la maquinaria de espolvoreo o mochila, porque esparce el polvo de manera regular. No se compacta en la tolva, el producto fluye mejor, tiene una velocidad más elevada y no se atasca.



ENVASES


• **5 Kg / 10 Kg / 25 Kg / Big bag 500 Kg**




DOSIS RECOMENDADAS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS Kg/ha	N. APLIC.	INTERVALOS	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Fresal	Ácaros Araña roja Oídio	20-27,4 20-30 20-27,4	3	7-14	Se puede aplicar en todo el ciclo del cultivo.
Melón / Sandía	Oídio Ácaros Araña roja Oidiopsis	20-30	Máx. 3	7-10	Se puede aplicar en todo el ciclo del cultivo.
Tomate	Ácaros Araña roja Oidiopsis Oídio	20-30	Máx. 3	7-10	Aplicar hasta madurez completa (BBCH 89).
Vid	Araña roja Ácaros Eriófidis Oídio	20-30	Máx. 5	10	Dosis máxima por aplicación: 30 Kg pf/ha en 1ª y 2ª aplicación, 25 Kg pf/ha en 3ª aplicación, 20 Kg/ha en la 4ª y 5ª aplicación. Aplicar desde el estadio de 5 hojas, desplegadas (BBCH 15) hasta que las bayas están listas para recolectarse (BBCH 89). En la etapa del cultivo comprendida desde el desarrollo de las hojas hasta la aparición del órgano floral (BBCH 15-19), solo se podrá efectuar una aplicación de máximo 30 Kg pf/ha.

*Plazo de seguridad: No procede



Gracias a tener diferentes tamaños de partícula, el azufre micronizado AFEPASA cubre de forma eficiente toda la superficie impidiendo que el hongo llegue a prosperar en zonas no protegidas. Además, los vapores creados por el azufre, por sublimación, impiden la proliferación de las esporas y no pueden crecer los hongos.



Los huecos que dejan los elevados tamaños de partícula y los agregados de partículas finas, dan al hongo la oportunidad de desarrollarse en la hoja.

