

AFESOXIM

Granulado dispersable en agua (WG)

FUNGICIDA

Composición: Kresoxim-metil 50% p/p (500 g/Kg)

Inscrito en el ROPF n. ES-00853



DESCRIPCIÓN: Fungicida de la familia de las estrobilurinas (concretamente a la estrobilurina A, que es un metabolito fúngico aislado del hongo *Strobilurus tenacellus*) que actúa contra oídios, moteado, stemphylium y repilo.



ENVASES

• 600 g

FORMA DE ACCIÓN

Es un fungicida sistémico con acción translaminar.

- Buena cobertura y distribución, debido al movimiento translaminar y difusión de vapor.
- Excelente resistencia a la lluvia.
- Eficacia a bajas temperaturas.
- Alta persistencia de acción.

MANEJO DE RESISTENCIAS

El modo de acción uni-sitio de las estrobilurinas puede provocar la aparición de problemas de resistencia. En consecuencia, la aplicación de Kresoxim-methyl 50 WG debe alternarse con fungicidas de otro MoA, o mezclarse con un fungicida multi-sitio o de MoA diferente, respetando el número máximo de aplicaciones de QoI establecido a nivel nacional, de acuerdo con las directrices generales de FRAC para QoI.

USOS Y DOSIS AUTORIZADOS

| Cultivo | Plaga | Dosis | Vol. Caldo | Núm. tratamientos | Estado crecimiento | Intervalo entre aplicaciones |
|---------|--|-----------|---------------|-------------------|--|------------------------------|
| Peral | Moteado (<i>Venturia pyrina</i>) Mancha negra (<i>Stemphylium vesicarium</i>) | 0.2 kg/ha | 800-1000 L/ha | 3 | 1ª aplicación BBCH 57 | 8-14 días |
| Manzano | Oídio (<i>Podosphaera leucotricha</i>) Moteado (<i>Venturia inaequalis</i>) | | | | | |
| Viña | Oídio (<i>Uncinula necator</i>) Black rot (<i>Guignardia bidwellii</i>) | 0.3 kg/ha | 300-1000 L/ha | 2 | Aplicar durante BBCH 19-81. Primera aplicación con la aparición de los primeros síntomas | 10-14 días |
| | | | | 3 | | |
| Olivo | Repilo (<i>Venturia oleagina</i>) | 0.2 kg/ha | 500-1000 L/ha | 2 | Aplicar durante BBCH 50-55 | 14 días |

AFEPASA
PALLARÉS SULPHUR
SINCE 1893

www.afepasa.com